

# CHOEP

## CHIMIOTHÉRAPIE LYMPHOME

→ **Lieu du traitement :** Hôpital de Jour ou hospitalisation (3 jours de suite)

→ **Nombre de cycles prévus :** 6 • → **Rythme des cycles :** tous les 21

			J1	J2	J3	J4	J5
Etoposide	Intraveineux	100mg/m <sup>2</sup>					
Cyclophosphamide	Intraveineux	750mg/m <sup>2</sup>					
Doxorubicine	Intraveineux	50mg/m <sup>2</sup>					
Vincristine	Intraveineux	1,4mg/m <sup>2</sup>					
Medrol 32 mg	Voie orale	64 mg/j					

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et votre poids

→ **Durée de l'administration du traitement :** environ 4 heures le premier jour, 2h les suivants

→ **Évaluation de la maladie :** par pet scanner après 3 cycles et 6 cycles

→ **Particularités :** aucune

### Traitements associés :

→ **Prévention des infections :**

- Aciclovir 800 mg ½ cox2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi
- Neulasta à J4 en sous-cutanée

→ **Troubles digestifs :**

- Pantomed 40 mg 1co/j
- Litical 6 co/j si nausées
- Movicol 3 sachets/j si constipation

### Effets secondaires principaux : variables et peuvent ne pas tous être ressentis

- Fatigue
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Chute des cheveux
- Nausées, troubles digestifs
- Engourdissements des mains ou des pieds
- Coloration orange des urines