

CHOP

CHIMIOTHÉRAPIE LYMPHOME

→ **Lieu du traitement** : Hôpital de Jour

→ **Nombre de cycles prévus** : 6

→ **Rythme des cycles** : tous les 21 jours

			J1	J2	J3	J4	J5
Cyclophosphamide	Intraveineux	750mg/m ²					
Doxorubicine	Intraveineux	50mg/m ²					
Vincristine	Intraveineux	1,4mg/m ²					
Medrol 32 mg	Voie orale	64 mg/j					

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et votre poids

→ **Durée de l'administration du traitement** : Environ 2 heures

→ **Évaluation de la maladie** : Par pet scanner après 3 cycles et 6 cycles

→ **Particularités** : Aucune

Traitements associés :

→ **Prévention des infections** :

- Aciclovir 800 mg ½ cox2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi
- Neulasta à J4 en sous-cutanée

→ **Troubles digestifs** :

- Pantomed 40 mg 1co/j
- Litical 6 co/j si nausées
- Movicol 3 sachets/j si constipation

Effets secondaires principaux : variables et peuvent ne pas tous être ressentis

- Fatigue
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Chute des cheveux
- Nausées, troubles digestifs
- Engourdissements des mains ou des pieds
- Coloration orange des urines (fréquent et sans gravité)