









DARATUMUMAB MONOTHÉRAPIE CYCLES 1 ET 2

CHIMIOTHÉRAPIE MYÉLOME MULTIPLE

→ **Lieu du traitement** : Hôpital de Jour

→ **Nombres de cycles prévus** : jusqu'à progression → **Rythme des cycles** : 28 jours

Semaine		Semaine 1							Semaine 2							Semaine 3							Semaine 4						
Jour		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Daratumumab 16mg/kg	Sous-cutané																												
Dexaméthasone 40mg	Voie orale																												

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et de votre poids

→ **Durée de l'administration du traitement** : 4 heures et selon votre tolérance possibilité d'administration en 1h30

→ **Évaluation de la maladie** : par prise de sang +/- contrôle des urines à chaque début de cycle

→ **Précautions** : Bien boire, ne pas prendre d'anti-inflammatoires (Voltaren, Apranax, Neurofen, Ibuprofène, etc.), ne pas faire d'injection de produit de contraste lors d'un scanner et suivre un régime faible en sucres rapides les jours et lendemains de la Dexaméthasone

Prévention des infections

- Aciclovir 800 mg ½ co x 2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi
- Vaccination contre le pneumocoque et annuelle contre la grippe

Traitements associés

- Zometa/ Xgeva (biphosphonate) 1x/cycle
- Pantoprazole 20 mg 1x/j
- D-cure 1x/15 jours
- Carbonate de calcium 1g 1x/j
- Pimpéran 1 co 3x/j si nausée

Effets secondaires principaux (variables et peuvent ne pas tous être ressentis)

- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Risque de baisse des plaquettes (saignement)