






# DÉCITABINE

## CHIMIOTHÉRAPIE SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE/LEUCÉMIE AIGÛE MYÉLOÏDE

⇨ **Lieu du traitement** : Hôpital de Jour +/- HAD

⇨ **Nombre de cycles prévus** : En continu

⇨ **Rythme des cycles** : Tous les 28 jours

			J1	J2	J3	J4	J5
Décitabine	Intraveineux	750mg/m <sup>2</sup>					

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et votre poids

⇨ **Durée de l'administration du traitement** : Environ 1 heure

⇨ **Évaluation de la maladie** : Par prise de sang et ponction de moelle après 6 cycles

⇨ **Particularités** : Aucune

### Traitements associés :

⇨ **Prévention des infections** :

- Aciclovir 800 mg 1/2 cox2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi

⇨ **Troubles digestifs** :

- Pantomed 40 mg 1co/j
- Litican 6 co/j si nausées
- Movicol 3 sachets/j si constipation

### Effets secondaires principaux : variables et peuvent ne pas tous être ressentis

- Fatigue
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Risque de baisse des plaquettes (saignement) et d'anémie (essoufflement)
- Nausées, troubles digestifs