

MINICHOP

CHIMIOTHÉRAPIE LYMPHOME

••••• **Lieu du traitement** : Hôpital de Jour (sauf la première cure en hospitalisation pour le Rituximab intraveineux)

••••• **Nombre de cycles prévus** : 6

••••• **Rythme des cycles** : Tous les 21 jours

			J1	J2	J3	J4	J5
Cyclophosphamide	Intraveineux	400g/m ²					
Doxorubicine	Intraveineux	25mg/m ²					
Vincristine	Intraveineux	1g/m					
Medrol 32 mg	Voie orale	64 mg					

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et votre poids

••••• **Durée de l'administration du traitement** : Environ 2 heures

••••• **Évaluation de la maladie** : Par pet scanner après 3 cycles et 6 cycles

••••• **Particularités** : Aucune

Traitements associés :

••••• **Prévention des infections** :

- Aciclovir 800 mg 1/2 cox2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi
- Neupogen si besoin

••••• **Troubles digestifs** :

- Pantomed 40 mg 1co/j
- Litican 6 co/j si nausées
- Movicol 3 sachets/j si constipation

Effets secondaires principaux : variables et peuvent ne pas tous être ressentis

- Fatigue
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Chute des cheveux
- Nausées, troubles digestifs
- Engourdissements des mains ou des pieds
- Coloration orange des urines