

RCOEP

CHIMIOTHÉRAPIE LYMPHOME

••••• **Lieu du traitement :** hospitalisation (3 jours de suite)

••••• **Nombre de cycles prévus :** 6

••••• **Rythme des cycles :** tous les 21 jours

			J1	J2	J3	J4	J5
Rituximab	Sous-cutanée	1400 mg					
Cyclophosphamide	Intraveineux	750mg/m ²					
Doxorubicine	Intraveineux	50mg/m ²					
Vincristine	Intraveineux	1,4mg/m ²					
Medrol 32 mg	Voie orale	64 mg/j					

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et votre poids

Prémédication (comprimés d'anti douleur, d'antihistaminique et medrol) 45 min avant le traitement

••••• **Durée de l'administration du traitement :** environ 4 heures le premier jour, 2h les suivants

••••• **Évaluation de la maladie :** par pet scanner après 3 cycles et 6 cycles

••••• **Particularités :** aucune

Traitements associés :

••••• **Prévention des infections :**

- Aciclovir 800 mg 1/2 cox2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi
- Neulasta à J4 en sous-cutanée

••••• **Troubles digestifs :**

- Pantomed 40 mg 1co/j
- Litican 6 co/j si nausées
- Movicol 3 sachets/j si constipation

Effets secondaires principaux : variables et peuvent ne pas tous être ressentis

- Fatigue
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Chute des cheveux
- Nausées, troubles digestifs
- Engourdissements des mains ou des pieds