







RICE

CHIMIOTHÉRAPIE LYMPHOME

••••• **Lieu du traitement :** hospitalisation

••••• **Nombre de cycles prévus :** 3

••••• **Rythme des cycles :** tous les 21 jours

			J1	J2	J3
Rituximab	Intraveineux	375mg/m ²			
Etoposide	Intraveineux	100mg/m ²			
Ifosfamide	Intraveineux	5000mg/m ²			
Carboplastine	Intraveineux				

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et votre poids

••••• **Durée de l'administration du traitement :** 3 jours

••••• **Évaluation de la maladie :** Par pet scanner après 2 cycles

••••• **Particularités :** perfusion sur chambre implantable

Traitements associés :

••••• **Prévention des infections :**

- Aciclovir 800 mg 1/2 cox2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi
- Neulasta à J4 en sous-cutanée

••••• **Troubles digestifs :**

- Pantomed 40 mg 1co/j
- Litican 6 co/j si nausées
- Movicol 3 sachets/j si constipation

Effets secondaires principaux : variables et peuvent ne pas tous être ressentis

- Fatigue
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Nausées, troubles digestifs