












VCD BIHEBDOMADAIRE

CHIMIOTHÉRAPIE MYÉLOME MULTIPLE

••• **Lieu du traitement :** Jour 1 en Hôpital de Jour. Par la suite en Hôpital de Jour +/- HAD

••• **Nombres de cycles prévus :** 6 à 8 cycles

••• **Rythme des cycles :** tous les 21 jours

Semaine		Semaine 1							Semaine 2							Semaine 3						
Jour		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Velcade 1.3mg/m ²	Sous-cutané																					
Dexaméthasone 40 mg	Voie orale																					
Endoxan 300 mg/m ²	Voie orale																					

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et de votre poids

••• **Durée de l'administration du traitement :** 10 minutes

••• **Évaluation de la maladie :** par prise de sang +/- contrôle des urines à chaque début de cycle

Prévention des infections

- Aciclovir 800 mg 1/2 co x 2/j
- Bactrim 800 mg 1co le lundi-mercredi-vendredi
- Vaccination contre le pneumocoque et annuelle contre la grippe

Traitements associés

- Zométa/Xgeva (biphosphonates) 1x/cycle
- Pantoprazole 20 mg 1x/j
- D-cure 1x/15 jours
- Carbonate de calcium 1g 1x/j
- Primpéran 1 co 3x/j si nausées

Effets secondaires principaux (variables et peuvent ne pas tous être ressentis)

- Rougeur locale au point d'injection
- Troubles du sommeil les jours de prise de prednisone
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Risque de baisse des plaquettes (saignement)
- Nausées, troubles digestifs
- Engourdissements des mains ou des pieds