

VIDAZA

CHIMIOTHÉRAPIE SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE/LEUCÉMIE AIGÛE MYÉLOÏDE

••••• **Lieu du traitement :** Hôpital de Jour +/- HAD

••••• **Nombre de cycles prévus :** En continu

••••• **Rythme des cycles :** Tous les 28 jours

			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8 à J28
Vidaza	Sous-cutanée	75mg/m ²								repos

Les doses sont calculées en fonction de votre taille et votre poids

••••• **Durée de l'administration du traitement :** Environ 5 minutes

••••• **Évaluation de la maladie :** Par prise de sang et ponction de moelle après 6 cycles

••••• **Particularités :** Le produit est administré par voie sous-cutanée au niveau du haut du bras, de l'abdomen ou des cuisses. Généralement, le produit est préparé dans 2 seringues et nécessite donc 2 sites d'injection. Il est important d'alterner les sites d'injection pendant toute la cure. Il est conseillé de masser en profondeur la zone juste après l'injection.

Traitements associés :

••••• **Prévention des infections :**

- Aciclovir 800 mg 1/2 cox2/j

••••• **Troubles digestifs :**

- Pantomed 40 mg 1co/j
- Zofran 8mg 1cpx2/j pendant les injections de Vidaza
- Litical 6 co/j si nausées
- Movicol 3 sachets/j si constipation

Effets secondaires principaux : variables et peuvent ne pas tous être ressentis

- Fatigue
- Risque d'infection avec la baisse des globules blancs
- Risque de baisse des plaquettes (saignement) et d'anémie (essoufflement)
- Nausées, troubles digestifs
- Rougeurs et /ou des desquamations au niveau des sites d'injection